


# Nifer o oedolion ddim yn gwybod arwyddion anhwylderau bwyta : BBC

Darganfu arolwg gan YouGov na allai traean o oedolion enwi  symptomau seicolegol [anhwylderau bwyta](#), megis [hunan-barch isel](#) neu [dysmorffia'r corff](#).

Dywedodd yr elusen anhwylderau bwyta, [Beat](#), bod cysylltiad rhwng diffyg ymwybyddiaeth o arwyddion cynnar cyflyrau megis anorecsia a bwlimia, ac oedi cyn triniaeth a risg gynyddol o'r salwch yn dod yn beryg bywyd.

Dywed yr elusen Beat mai'r prif arwyddion i edrych amdanynt yw:

- Datblygu obsesiwn â bwyd
- Newid mewn ymddygiad
- [Dysmorffia'r corff](#)
- Blinder ac anhawster canolbwyntio
- Diflannu i'r tŷ bach ar ôl prydau bwyd
- Dechrau gwneud ymarfer corff yn ormodol

Os ydych chi'n poeni am rywun agos atoch, siaradwch â nhw a'u hannog i fynd i weld eu meddyg teulu.

- 
- [Darllen rhagor : BBC \(Saesneg\)](#)
  - [Anhwylderau Bwyta](#)
  - [Anhwylder Dysmorffia'r Corff](#)
  - [Wythnos Ymwybyddiaeth Anhwylderau Bwyta](#)
  - ['Gallai camsyniadau am anhwylderau bwyta fod yn niweidiol'](#)
  - [Cymorth](#)